

particulièrement saillante au départ de l'épaule, se prolonge, étroite et coupante, jusqu'à l'apex, où elle forme, par sa jonction avec la marge externe et la suture, un très petit denticule sutural de chaque côté.

Par ses proportions et sa sculpture très spéciale, c'est bien certainement l'espèce la plus remarquable du genre et je me fais un devoir de la dédier à la mémoire de mon regretté confrère et ami T. TSHITSHERINE qui nous a laissé d'excellents travaux sur les Féroniens et particulièrement sur les *Eucamptognathus*. Dans le dernier tableau qu'il a rédigé sur ce genre (*Horae Soc. entom. ross.*, XXXVI [1903], pp. 204-230), *E. Tshitsherini*, par la striation exceptionnelle des élytres, vient se placer en tête avec *E. granulifer* Tshitsh., mais il ne ressemble en rien à cette espèce et, comme je l'ai déjà indiqué, malgré des différences considérables, c'est près d'*E. Dostoierskyi* Tshitsh. qu'il devra se placer.

\* \* \*

*Eucamptognathus granulifer* Tshitsh. (*Horae Soc. ent. Ross.*, XXXIV [1900], pp. 110 et 113; XXXVI [1903], p. 206) est décrit sur un exemplaire unique du Muséum de Paris. C'est une espèce encore plus isolée dans le genre *Eucamptognathus* que *E. Tshitsherini*.

Le type porte une étiquette ainsi libellée : « Madagascar. GRANDIDIER-1851.91 ». Cette rédaction demande une explication : 1851 n'est pas une date, mais un numéro d'ordre, sous lequel est inscrit un lot d'insectes envoyés de Madagascar par M. ELLIOT à M. A. GRANDIDIER qui en a fait don au Muséum de Paris en 1891.

---

#### Description d'un *Mayetia* nouveau [COL. STAPHYLINIDAE]

par H. LAVAGNE.

**Mayetia Galiberti**, n. sp. — *Rufa-testacea, nitida, elongata, depressa, levissime punctata, pubescens; fronte foveolis antice leviter convergentibus, vertice foveolato.*

♂. *Abdominis segmento 6° fossulato, ultimo leviter carinato.*

Testacé, brillant, allongé et déprimé, à pubescence bien visible, plus forte et plus fournie sur l'abdomen.

Tête bien plus large à la base qu'au sommet, allongée, à angles postérieurs très marqués, quoique obtus. bords latéraux convergents ;

dessous marqué d'une fossette grande et profonde; sur le front deux sillons un peu convergents vers le sommet, limités chacun en arrière par une fossette enchâssant le point ocellaire; au milieu de la base se trouve une échancrure qui se rétrécit pour devenir un fin sillon s'arrêtant à la hauteur des fossettes.

Antennes de 11 articles; les deux premiers volumineux, le 1<sup>er</sup> plus long que large, le 2<sup>e</sup> globuleux un peu plus étroit, les suivants de dimension plus faible, 3, 4, 6, 8 plus larges que longs, 5 et 7 bien davantage, dépassant la largeur des articles contigus; les trois derniers formant massue, le 9<sup>e</sup> discoïde, très transverse, moins large que le 10<sup>e</sup> qui est volumineux, cupuliforme, près de deux fois plus large que long; le 11<sup>e</sup>, soudé au précédent et de même largeur à la base, est conique, un peu acuminé et très pubescent.

Corselet un peu plus long et moins large que la tête, déprimé, un peu dilaté antérieurement, rétréci, puis étranglé vers la base d'où partent deux fins sillons parallèles atteignant presque le milieu du disque, et, devant le sommet, un trait fin ne touchant pas le bord antérieur.

Élytres légèrement rétrécies à la base, de la longueur du corselet et un peu plus larges que lui.

Abdomen fortement rebordé, les 5 premiers segments à bords légèrement évasés de la base vers le sommet; le 6<sup>e</sup> a les bords arrondis et munis de chaque côté au sommet d'une large dent enchâssant le 7<sup>e</sup> qui est plus étroit, ogival et orné de deux fins sillons en forme de V.

Dessous de l'abdomen très pubescent, non déprimé.

Le métasternum porte une carène obtuse, mais bien visible depuis la base jusque vers le milieu.

Chez le ♂, le 6<sup>e</sup> sternite est marqué d'une fossette profonde, arrondie à la base, à bords latéraux parallèles formant bourrelet et dont les sommets s'avancent en pointe acuminée et recourbée en dedans; entre les pointes, le bord du sternite est échancré; sur le 7<sup>e</sup> est une carène obtuse et brillante.

La sculpture du 6<sup>e</sup> sternite rappelle celle de *M. perpusilla*, mais, chez ce dernier, les bords convergent vers le sommet et les pointes recourbées sont plus acuminées.

Cette espèce diffère de *M. sphaerifera* Rey et *M. istriensis* Breit par ses sillons frontaux non réunis au sommet, de *M. perpusilla* Norm. par la fossette du vertex et de *M. corsica* Sauley par sa taille et son corselet plus allongé et orné de sillons. Doit prendre place entre ces deux derniers.

Dédié à M. H. GALIBERT, notre collègue et ami, qui en a récolté plusieurs exemplaires dans les environs de Castres (Tarn) aux mois de janvier et février 1914.

---

### Deux Braconides nouveaux de l'Afrique occidentale [HYM.]

par J. BEQUAERT.

Mon excellent ami M. E. ROUBAUD m'a remis pour examen deux Braconides dont les larves vivent en commensales dans les nids de certains Euméniens en Afrique occidentale française. Nous avons reconnu qu'il s'agissait de deux espèces inédites que nous décrivons ci-après, en raison des particularités intéressantes de leur biologie.

1. **Euvipio commensalis**, n. sp. — ♂. Petite espèce d'un rouge jaunâtre; la moitié supérieure de la tête, les antennes, la moitié postérieure du 3<sup>e</sup> tergite abdominal et les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tergites en entier, noirs; tibias et tarses postérieurs d'un brun noirâtre; ailes enfumées noires, à léger reflet nacré, avec de petites taches claires mal définies vers le milieu; stigma et nervures uniformément noirs; l'extrême base de l'aile et les tegulae d'un roux pâle.

Tête transversale, lisse, luisante, beaucoup plus large que le thorax; vertex et face, entre les yeux, larges, bien développés, occupant la moitié de la largeur de la tête; joues et tempes bien développées; face, clypéus et mandibules faiblement allongés vers le bas en bec obtus; face en dessous des antennes aplatie, un peu déprimée au milieu dans sa partie supérieure; clypéus sans faisceaux de soies longues sur les côtés; pièces buccales, y compris les palpes, de la même coloration jaune rougeâtre que la partie inférieure de la tête; antennes épaisses, filiformes, aussi longues que le corps, à flagelle composé de 42 articles allongés.

Thorax luisant, lisse; sillons parapsidaux très profonds, se réunissant dans une légère dépression en avant du scutellum; ce dernier normal, légèrement convexe, peu saillant. Segment médiaire grossièrement et irrégulièrement ridé, avec une légère crête longitudinale médiane, arrondie en avant, qui se bifurque en arrière en 2 fines carènes tranchantes.

Pattes lisses et luisantes, inermes; les antérieures et médianes courtes et grêles; les postérieures très longues et très robustes, à